

递法明益™ 包衣片

24或60片装盒

BIOCODEX 

欧洲越桔果花青素提取物  
α-生育酚乙酸酯浓缩物-粉末

**开始服用本药之前，请仔细阅读本说明书。它包含对您重要的信息。**

如果您有任何进一步的问题或疑虑，请咨询您的医生或药剂师。  
保留此说明书。您可能需要再读一遍。  
询问药剂师是否需要更多信息或建议。  
如果症状恶化或没有好转，您必须联系医生。  
如果任何不良反应变得严重，或者您注意到本说明书中未列出的任何不良反应。请告诉您的医生或药剂师。

**在说明书中**

1. 递法明益™ 包衣片剂，它的用途是什么？
2. 服用递法明益™ 包衣片剂前应注意的信息
3. 如何服用递法明益™，包衣片剂？
4. 可能存在的不良反应
5. 如何储存递法明益™，包衣片剂？
6. 附加信息

**1. 递法明益™ 包衣片剂？它的用途是什么？**

药物治疗学科属：

眼科/血管蛋白药物（S：感觉器官）

治疗适应症：

本品辅助治疗黄昏、夜晚视力障碍及近视。

**2. 服用递法明益™ 包衣片剂前应注意的信息**

如果您被告知患有某些葡萄糖不耐受症，请在服用本药前联系您的医生。

**不适合服用递法明益™ 包衣片剂：**

如果您对包衣片剂的任何成分过敏。如果您有任何疑问，请咨询您的医生或药剂师。

**服用递法明益™ 包衣片剂的注意事项：**

如果出现任何突发性视觉障碍或先前存在的障碍恶化，请告知您的医生。

对果糖不耐受、葡萄糖或半乳糖吸收不良综合征或蔗糖酶/异麦芽糖酶缺乏症（罕见遗传性疾病）的患者不建议使用本药。

如果您有任何疑问，请咨询医生或药剂师。

**服用其他药物**

如果您正在服用或最近服用过任何其他药物，包括未经处方获得的药物，请告知您的医生或药剂师。

**怀孕和哺乳**

怀孕期间最好不要使用这种药。

如果您在服用此药时怀孕，请咨询您的医生，因为他/她是唯一可以决定是否继续治疗的人。避免在哺乳期间服用此药。

服用任何药物前，请咨询医生或药剂师的建议。

**3. 如何服用递法明益™ 包衣片剂？**

**剂量：**

每天3至6片。

**用药方法和途径：**

口服。

用一杯水吞下药片，不要咀嚼。

**治疗持续时间：**

治疗必须每月20天。如有必要，可重复进行。

听从医生的建议。

**如果您超剂量的服用递法明益™ 包衣片剂：**暂无报告超剂量服用的案例。

但是超剂量使用会导致不良反应恶化的风险。

如果您超剂量服用了的递法明益™ 包衣片剂。联系您的医生或药剂师。

**4. 可能的不良反应**

像所有的药物一样，递法明益™，包衣片可能会引起不良反应，如：**轻微的消化障碍**。但不是每一位患者都会有不良反应。

**不良反应报告**

如果您有任何的不良反应，请咨询医生或药剂师。这包括本说明书中未列出的任何可能的不良反应。您还可以通过以下方式直接通过国家报告系统报告不良反应：

在法国，国家药品和保健品安全局（ANSM）和区域药物警戒中心网络网站：[www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

在卢森堡：卫生局-药房和药品部-卢维尼别墅-马可尼巷-L-2120卢森堡。

网站<http://www.ms.public.u/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

通过报告副作用，您可以帮助提供更多关于这种药物安全性的信息。

**5. 如何储存递法明益™ 包衣片剂？**

不要让儿童接触和看见。

在包装盒上注明的有效期后，请勿使用递法明益™ 包衣片剂。储存温度低于30° C。

药物不应与家庭垃圾一起丢弃或排入排水系统。询问药剂师如何处理未服用的药物。这些措施有助于保护环境。

**6. 附加信息**

**递法明益™ 包衣片剂含有什么？**

**活性物质包括：**

欧洲越桔果花青素提取物.....50 mg

α-生育酚乙酸酯浓缩物-粉末.....50 mg

该成分用于一片的片剂。

**其他成分包括：**

明胶、硅酸、微晶纤维素、交联羧甲基纤维素钠。 无水胶体二氧化硅，阿拉伯树胶，蔗糖，玉米淀粉，滑石粉，二氧化钛（E 171），Opaglos 6000。

**递法明益™ 包衣片剂外观和包装内容？**

该药物以包衣片剂的形式呈现，每盒24或60片包衣片剂。

**营销授权持有人：**

BIOCODEX

加里尼大街7号

94250 GENTILLY

**法国制造商：**

CENEXI

52, rue Marcel et Jacques Gaucher路

94120 FONTENAY SOUS BOIS法国

本传单最后批准时间：2014年7月

有关该药物的详细信息，请访问ANSM网站（法国）。